

Avertissements agricoles

DLP 26 - 4 - 56057944

PUBLICATION PERIODIQUE
ABONNEMENT ANNUEL

Régisseur de Recettes de la DDA
C.C.P. Montpellier 5238-57

N° 2 du 02 MAI 1986

BULLETIN DESTINE AUX AGRICULTEURS
DU LAURAGAIS ET DU RAZES

(rédigé en collaboration avec la ferme de Loudes,
les G.V.A., les CIVAM et les Coopératives).

POIS PROTEAGINEUX

Le risque Mildiou était important, mais diminue fortement avec le relèvement des températures. Les cultures les plus exposées sont les plus denses il convient donc de les surveiller très attentivement, une protection s'avère indispensable si aucun traitement n'a encore été réalisé. "N'hésitez pas éventuellement à consulter notre technicien".

Il y a risque également de Botrytis sur Fleurs, et l'Anthracnose peut encore se développer.

Nous vous conseillons d'appliquer pour ce complexe une bouillie à base de PELTAR à raison de 4 kgs/ha - Volume conseillé 400 L/HA.

----- CEREALES =====

BLES TENDRES ET BLES DURS

Etat sanitaire excellent, absence totale de Rouille Brune, d'oïdium et de Septoriose (Septoria Nodorum).

AUCUN TRAITEMENT N'EST A FAIRE POUR LE MOMENT

ORGES

La plupart des cultures sont touchées par la Rhynchosporiose et l'Helminthosporiose (Helminthosporium Teres).

Les seuils sont généralement atteints, d'autant que les conditions climatiques ont été très favorables aux deux maladies.

- Sur cultures précoces traitez dès le passage de la F4 sur la F3.
- Sur cultures tardives et prometteuses avec la base bien touchée, il faudra certainement renouveler le traitement.

TRAITEZ DES RECEPTION DU BULLETIN AVEC TILT C (complexe rhynchosporiose - Helminthosporiose) à raison de 1 L/HA

Tilt C -1 L/HA ; Impact R - 1.25 L/HA ; Corvet CM 4 kg/ha (Rhynchosporiose seule)

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

EDITION DE LA STATION LANGUEDOC - ROUSSILLON

Maison de l'Agriculture - Bâtiment 5, Place Chaptal

34076 MONTPELLIER CEDEX - Tél. (67) 92.41.42

